

PREPARAZIONE PER LA ENTERO-RM

IMPORTANTE:

all'atto della prenotazione comunicare eventuali reazioni allergiche pregresse ai mezzi di contrasto e a farmaci, presenza di orticaria o angioedema o asma non controllati farmacologicamente, se si è affetti da mastocitosi o se si ha storia di pregresse reazioni anafilattiche. Infine se si è in Insufficienza Renale.

Che cos'è l'Entero-RM

È una metodica non invasiva di imaging che, con l'impiego di un potente campo magnetico e di impulsi di Radiofrequenza, mediante l'utilizzo di un mezzo di contrasto neutro per via orale e di un mezzo di contrasto paramagnetico per via endovenosa, permette di studiare l'intestino. In particolare è indicata nell'identificazione delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino e delle sue complicanze.

PREPARAZIONE

il paziente deve acquistare in farmacia alcuni giorni prima dell'esame una confezione di **LOVOL-DYL** ed una di **LOVOL ESSE**.

Nei due giorni precedenti l'esame

assumere una dieta a basso contenuto di scorie:

- ✓ non ammessi frutta e verdura con semi e buccia, pasta e pane integrali, cereali interi, carni dure e fibrose, frutta secca
- ✓ ammessi pane e pasta non integrali, patate, carne magra, prosciutto, pesce, uova, burro, gelato, formaggi, yogurt, brodo.
- ✓ la sera precedente l'esame assumere solo liquidi

Il giorno precedente l'esame

-assumere 4 compresse di **LOVOL-DYL** alle ore 16

-sciogliere 2 buste di **LOVOL ESSE** per ogni litro di acqua per un totale di 2 litri.

-PRIMA DOSE: bere 1 litro di soluzione di **LOVOL ESSE** in un'ora

-SECONDA DOSE: bere il restante litro di soluzione di **LOVOL ESSE** in un'ora

Il giorno dell'esame

Si deve essere a **digiuno per i solidi** mentre **si può bere fino a due ore prima dell'esame**. Se l'esame è nel pomeriggio, è possibile fare colazione leggera (the, caffè, no cibi solidi).

*Si informa il paziente che deve presentarsi un'ora prima dell'esecuzione dell'esame poiché verrà data una soluzione di acqua e **LOVOL ESSE** da bere in 20 minuti. Prima dell'inizio dell'esame verrà somministrato uno spasmolitico ev (**buscopan**). Durante l'esame verrà somministrato il mdc paramagnetico ev.*

Si ricorda al paziente di portare i precedenti clinico-strumentali e l'esame della Creatinina non antecedente i tre mesi dalla data dell'esame.

I pazienti in cura con terapia farmacologica, non devono sospenderla.